VISAID® macula

A la vanguardia de la ***nutrición ocular*** *en la prevención de la* ***DMAE***

SOLO 1 CÁPSULA AL DÍA[1]

PROPIEDADES DE LOS ***CAROTENOIDES Y LA ZEAXANTINA***

Carotenoides: Luteína (10mg) y Zeaxantina (2mg)

- Disminuyen el riesgo de desarrollar **DMAE[2]**
- Disminuyen el riesgo de desarrollar **cataratas[3]**

Cantidades recomendadas en AREDS2 Estudio AREDS2[15]

Carotenoide*	VISAID® Macula	Otros
Luteína	100%	≤60%
Zeaxantina	100%	≤25%

*Contenido por cápsula

PROPIEDADES DEL ***EXTRACTO DE GINGKO***

EXTRACTO DE GINGKO

- Mejora la visión en pacientes con retinopatía **diabética[4]**
- Mejora los síntomas y visión a distancia en pacientes con **DMAE[5]**
- Mejora la circulación sanguínea y la visión en pacientes con **glaucoma[6]**

Excelente tolerancia y fácil deglución

MEJORA LA ADHERENCIA

Complemento alimenticio para la salud [1]

FORMULACIÓN COMPLETA CON

DHA, EPA, ANTIOXIDANTES, VITAMINAS Y MINERALES[1]

DMAE: degeneración macular asociada a la edad *El 11-25% de los pacientes con diabetes desarrolla retinopatía diabética[7].

Referencias: 1. Prospecto VISAID® Macula. 2. Seddon JM, et al. Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced age-related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. JAMA. 1994;272(18):1413-20. 3. Brown L, et al. A prospective study of carotenoid intake and risk of cataract extraction in US men. American Journal Clinical Nutrition, 1999;70(4):517-24. 4. Lanthony P, Cosson JP. The course of color vision in early diabetic retinopathy treated with ginkgo biloba extract. A preliminary, double-blind versus placebo study. J Fr Ophtalmol, 1988;11(10):671-4. 5. Evans JR. Ginkgo biloba extract for age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev, 2000;(2):CD001775. 6. Quaranta L, Bettelli S, Uva MG, et al. Effect of Ginkgo biloba extract on preexisting visual field damage in normal tension glaucoma. Ophthalmology, 2003;110:359-62. 7. Heller T, et al. Diabetic co-morbidities: prevalences in Germany. Dtsch Med Wochenschr, 2014;139(15):786-91.

TEST DE AMSLER

VISAID macula



El test de la rejilla de Amsler es una prueba que permite detectar precozmente enfermedades que afectan a la mácula en el centro de la retina, como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), el edema macular de las personas diabéticas, la alta miopía… El objetivo de esta prueba es valorar la calidad de la visión central que es la que se ve afectada en las patologías oculares anteriormente descritas.

Instrucciones para realizar el test:

- Colocarse a 35 cms. de distancia del monitor con las gafas de visión próxima
- Tapar un ojo
- Mirar fijamente el punto central de la rejilla
- Repetir el mismo procedimiento con el otro ojo

Realizado el test, intente que responda a estas preguntas:

¿Ve líneas torcidas o dobladas?
¿Ve líneas onduladas o borrosas?
¿Ve líneas que desaparecen en algún punto?